

Richtlijn

Oorzalf aanbrengen

Doel

Het ondersteunen van een behandeling door middel van een voorgeschreven medicatie.

Algemene opmerkingen

De handeling mag alleen worden verricht in opdracht van een arts.

Benodigheden

- Oorzalf
- Handschoen of vingercondoom
- Doseringvoorschrift en reden waarom het medicijn wordt toegediend.

Voorbereiding

- Stel jezelf op de hoogte van de werking en de bijwerking(en) van het geneesmiddel
- Controleer van het geneesmiddel de naam, dosis, toedieningwijze, vervaldatum en voorgeschreven tijdstip van inname, alsook de naam van de cliënt
- Vermeld, na het voor de eerste keer openen van de tube, de datum en de naam van de cliënt op het etiket
- Zet alle benodigheden binnen handbereik
- Handen wassen
- Zorg voor privacy
- Leg de cliënt zo begrijpelijk mogelijk het doel van de handeling uit; wat er gaat gebeuren en dat alles pijnloos kan verlopen, of indien deze dit niet kan begrijpen: noem de naam van de cliënt en vertel dat er iets gaat gebeuren.

Werkwijze

- Laat de cliënt het hoofd iets opzij buigen.
- Schroef het dopje van de tube, leg het op zijn kant op een schone ondergrond
- Haal de oorschelp iets naar achteren en omhoog zodat de gehoorgang duidelijk zichtbaar is
- Breng de zalf (eventueel met gebruik van handschoen of vingercondoom) aan op de voorgeschreven wijze en plaats.
- Laat de oorschelp los
- Laat de cliënt het hoofd weer in de gewone houding brengen.
- Sluit de tube met zalf weer af
- Ruim het materiaal op
- Handen wassen.
- Noteer in het dossier (of ander afgesproken plaats) dat de medicatie is toegediend.

Complicaties

Zie de bijsluiters van het geneesmiddel.

Complicaties moeten altijd in het zorgdossier worden opgeschreven en aan de arts te worden gemeld.

Mag zelfstandig worden verricht door

Iedereen die zich hiertoe bekwaam acht en toestemming heeft van de verantwoordelijke leidinggevende

Let op:

Het is de bedoeling met deze richtlijn een bijdrage te leveren aan een goede, verantwoorde en doelmatige zorg- en dienstverlening. Het kan zo nodig worden aangepast aan de individuele wensen van de cliënt. Bij twijfel ten aanzien van de uitvoering van deze richtlijn of in situaties waarin deze richtlijn niet voorziet, overlegt men met de direct leidinggevende.

Afwijken van deze richtlijn kan soms noodzakelijk zijn, doch men zal afwijken van deze richtlijn te allen tijde moeten kunnen motiveren. Deze richtlijn is slechts een hulpmiddel en kan en mag nimmer de plaats innemen van het eigen denken en handelen van de zorgverlener / ondersteuner.

De zorgverlener / ondersteuner kent en neemt bij het hanteren van deze richtlijn zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Deze richtlijn is niet bedoeld voor particulier gebruik.

Auteur: D.Slagter, verpleegkundige

Publicatiedatum: 1 mei 2001

Laatste herziening: 07-03-2011

Disclaimer: De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van deze richtlijn. Raadpleeg zo nodig de arts.

Copyright © 2001 - 2012 Dick Slagter All rights Reserved.